

ОКТЕНИДЕРМ®

Состав: Октенидиндигидрохлорид-0,1 %, 1-Пропанол-30%, 2-Пропанол-45%.

Микробиологическая активность: Бактерицидная (включая микобактерии туберкулеза), фунгицидная, вирулицидная.

Свойства: Препарат на основе новейшего уникального действующего вещества - Октенидина. Широкий антимикробный спектр активности. Не раздражает кожу. Способствует заживлению ран. Быстрый (в течение 1 минуты) микроцидный эффект, продолжающийся до 6 часов. Не нарушает нормальной функции кожи. Обезжиривание.

Область применения: Обработка перед оперативными вмешательствами, инъекциями, пункциями, взятием проб крови или спинно-мозговой жидкости и другими подобными манипуляциями. Идеальное средство для ухода за ранами и язвами. В случае отсутствия специального средства для дезинфекции рук Октенидерм® можно использовать для гигиенической и хирургической обработки рук.

Метод применения: При обработке инъекционного поля кожу протирают стерильным тампоном, смоченным препаратом, время выдержки после обработки 1 мин. При обработке операционного и инъекционного полей, а также обработке ран и швов препарат может наноситься методом распыления. При гигиенической обработке рук наносят 3 мл Октенидерма и втирают в кожу в течение 30 сек. При обработке рук хирурга Октенидерм® наносят на предварительно вымытую и высушенную кожу по 3 мл (от 3 до 6 раз) и втирают в течение 5 мин, поддерживая кожу во влажном состоянии.

Способ и режимы применения подробно изложены в Инструкции по применению средства № 6/06 от 15. 11. 2006г.

Меры предосторожности: Октенидерм® легко воспламеняется, его не следует распылять и хранить вблизи открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от лекарств. Избегать попадания в глаза. При случайном попадании промыть проточной водой.